

Claves de subgéneros de *Camponotus* (Mayr, 1861) de la Península Ibérica e Islas Baleares.

1. Sutura mesopropodeal marcada en vista de perfil en casi todas las especies (fig. 1) excepto en *C. fallax*, cuya sutura mesopropodeal es difusa. Clípeo emarginado, muy acentuado en *C. fallax* (fig. 2).
 ***Myrmentoma***

Especies: *C. fallax*, *C. gestroi*, *C. lateralis*, *C. piceus*, *C. ruber*.



Fig. 1) Mesosoma y propodeo de *C. lateralis*




Fig. 2) Clípeo emarginado de *C. fallax*

- Sutura mesopropodeal difusa (fig. 3), de modo que mesonoto y propodeo forman una línea continua vistos de perfil. Clípeo emarginado o no. Si presentan una sutura mesopropodeal marcada (fig. 4a), no es tan acusada como en las anteriores y además el clípeo no está emarginado (fig. 4b) **2**



Fig. 3) Sutura mesopropodeal de *C. barbaricus*




Fig. 4) Sutura mesopropodeal y clípeo de *C. foreli*

2. Clípeo provisto de una arista media claramente distinguible (fig. 5a), Lóbulo medio más o menos rectangular (fig. 5b). Propodeo estrecho en vista dorsal (fig. 6) **3**




Fig. 5) Clípeo de *C. barbaricus*



Fig. 6) Propodeo estrecho de *C. barbaricus*

- Clípeo sin arista media ni lóbulo medio claramente definidos (fig. 7) Propodeo más o menos redondeado (fig. 8) ***Camponotus s. str.***

Especies: *C. herculeanus*, *C. ligniperda*, *C. vagus*.



Fig. 7) Clípeo de *C. vagus*



Fig. 8) Propodeo redondeado de *C. herculeanus*

3. Gastro brillante (fig. 9). Cuerpo poco peludo, brillante, al menos sobre el tórax (fig.10) **Tanaemyrmex**

Especies: *C. aethiops*, *C. amaurus*, *C. barbaricus*, *C. foreli*, *C. pilicornis*, *C. sylvaticus*, *C. universitatis*.




Fig. 9) Gastro brillante de *C. sylvaticus*



Fig. 10) Cuerpo brillante de *C. pilicornis*

- Gastro mate (fig. 11). Todo el cuerpo con una pubescencia tupida, mate (fig. 12) **Myrmosericus**

Especies: *C. cruentatus*, *C. micans*.



Fig. 7) Gastro mate de *C. micans*



Fig. 7) Pubescencia tupida de *C. cruentatus*

REFERENCIA:

Hormigas del género *Camponotus* (Mayr, 1861) de la Península Ibérica. Apuntes para ayudar en la identificación taxonómica, (Hymenoptera, Formicidae).

Fede García.